

Metoprolol, Seloken - Metoprolol Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Metoprolol, injektionsvätska (1 mg/ml)

Indikationer

- Vid symtomgivande takykardi
- Som profylax och behandling vid misstänkt eller säkerställd akut hjärtinfarkt om en takykardi har uppstått

Försiktighet

- Vid säkerställd eller misstänkt hjärtinfarkt, ska pågående behandling avbrytas om patientens dyspné eller kallsvettning förvärras
- Vid claudicatio intermittens, gravt nedsatt njurfunktion, svåra, akuta sjukdomstillstånd med metabolisk acidosis
- Vid Prinzmetals angina (spasmangina)
- Vid astma/KOL
- Patienter som står på kalciumhämmare t.ex. **Verapamil, Isoptin och Cardizem**

Kontraindikationer

- Icke kompenserad hjärtsvikt
- Kardiogen chock
- Sjuk sinusknuta
- AV-block av grad II och III
- Bradykardi
- (misstänkt) akut hjärtinfarkt med bradukarid eller/och hypotoni (systoliskt blodtryck < 110 mmHg)

Biverkningar

- Trötthet, huvudvärk, yrsel
- Perifer kyla i extremiteter och bradykardi
- Illamående och kräkningar
- Försämring av hjärtsvikt
- Bronkospasm hos patienter med astma (mindre vanligt)

Giltig fr.o.m: 2019-01-31

Giltig t.o.m: 2022-09-08

Identifierare: 44107

Metoprolol, Seloken - Metoprolol Ambulansverksamheten



Doser

- Vid symtomgivande takykardi kontakta läkare för eventuell ordination av inj. **Metoprolol (1 mg/ml)**, 1 ml/min i.v., titreras till effekt. Maxdos 15ml.

Speciellt att tänka på

- Ska sprutas långsamt.
- Bör inte ges vid inferior infarkt. Kan ge blodtrycksfall.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare