

# Ventoline - Salbutamol Ambulansverksamheten

**Gäller för:** Ambulansverksamhet

**Utförs på:** Ambulansverksamhet

Salbutamol, inhalationsvätska (2 mg/ml)

## Indikationer

- För behandling av astma/bronkobstruktion
- Vid bronkobstruktion vid brännskada/inhalationsskada
- Vid inhalation av skadliga ämnen

## Försiktighet

- Kan i mycket sällsynta fall leda till paradoxal bronkospasm. Avbryt behandlingen omedelbart om detta inträffar
- Allergiska reaktioner kan uppträda
- Använd med försiktighet till patienter med svår hjärt-kärlsjukdom och vid takykardi

## Kontraindikationer

- Överkänslighet mot Ventoline

## Biverkningar

- Takykardi, Palpitationer
- Muskelkramp
- Tremor och huvudvärk

## Doser

### Vuxen

- Vid alla angivna indikationer:  
Ge inh. **Salbutamol (2 mg/ml) 2,5ml**. Kan upprepas vid behov efter 10-20 minuter

### Barn

- Vid alla angivna indikationer:  
Ge inh. **Salbutamol (2 mg/ml)**, enl tabell. Späd med **NaCl (9 mg/ml)** till 2 ml totalt

Barn	Salbutamol (2 mg/ml) inhalation
Vikt	Volym
5 kg	0,4 ml
10 kg	0,75 ml
15 kg	1,0 ml
20 kg	1,5 ml
25 kg	2,0 ml
≥30 kg	2,5 ml

Kan upprepas efter 15 minuter

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**