

Cordaroneinfusion

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Helen Gustavsson, bitr. avdelningschef, medicinkliniken Växjö
Olle Bergström, överläkare, medicinkliniken Växjö
Carina Nilsson, överläkare, medicinkliniken Ljungby

Amiodaron (Cordarone®) är ett klass III antiarytmikum som förlänger refraktärtiden i hela reledningssystemet. Vid peroral tillförsel mycket lång halveringstid med full effekt först efter tre veckor. Ringa negativ inotrop effekt.

Indikationer

- Terapeutiskt vid recidiverande ventrikulärtackycardi / VF.
- Akut supraventrikulär tackyarytmi.
- Profylaktiskt vid svåra recidiverande supraventrikulära och ventrikulära arytmier som är resistent mot annan behandling

Kontraindikationer

- Bradykardi och AV-block om ej pacemaker.
- Försiktighet vid thyroideasjukdom.
- Grav cirkulationsvikt.

Biverkningar

- Hypotension.
- Bradykardi

Spädning

Skall ej blandas med NaCl.

Volypump-blanda 6 ml Cordarone, 50mg/ml i 250 ml Glukos 50 mg/ml

Koncentration: 1,2 mg/ml.

Sprutpump-blanda 6 ml Cordarone 50 mg/ml i 44 ml Glucos 50 mg/ml.

Koncentration: 6 mg/ml.

Infusionstid: 300 mg Cordarone ges vanligen på 1-6 timmar. Kan i akut skede ges under 20 minuter. Max dygnsdos 1200 mg.

Cordarone kan också ges outspätt iv enligt program för A-HLR

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare