

## Akut reversering av Waran

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

### Handläggning av patienter med Waran inför akuta operationer/ingrepp/trauma

#### Behandling av tillstånd som kräver omedelbar åtgärd och INR-nivå <1,5.

- Ge Confidex (protrombinfaktorkoncentrat) 10-30 E/kg. Total dos behöver sällan överstiga 1500 E. Omedelbar effekt. Duration c:a 6-8 timmar.
- Ge inj Konakion 10 mg iv. Effekt om 6-12 timmar, max effekt om 24 timmar.
- Tag PK. Ge mer Confidex, 500 E om PK >1,5. Tag nytt PK.
- Vid problem tag kontakt med koagulationsjour på MAS.
- Ett alternativ till Confidex är plasma. Ge 10 ml/kg kroppsvikt. Tänk dock på volymsbelastningen. Samråd med narkosläkare.

#### Behandling av tillstånd som kan vänta 12 timmar

- Ge inj Konakion 2-5-10 mg iv alternativt samma mängd injektionslösning på en sockerbit per oralt.
- Vanligen räcker 2 mg för att minska ett PK 2,0-3,0 till < 1,5 på 12-16 timmar
- En onödigt hög dos Konakion ger långdragna problem med titrering av Waran vid återinsättning.
- Kontrollera PK, tidigast 10 timmar efter Konakion.
- Om PK trots åtgärd är för högt, kan behandlingen kompletteras med Confidex inför op.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.