

Infusion Aclasta

Gäller för: Region Kronoberg

Infusion Aclasta (Zoledronsyra)

Indikation: Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med ökad risk för frakturer.

Att tänka på: Patienterna måste vara väl hydrerade före administrering av Aclasta. Detta är särskilt viktigt för äldre och för patienter som får behandling med diuretika. För att minska risken för förmaksflimmer skall S-Ca ligga inom normalområdet innan infusionen.

Minst en vecka innan infusionen och en tid efter bör patienten behandlas med kalk och D-vitamin i adekvata mängder. I normalfallet står patienten på detta kontinuerligt.

Tag P-Ca, P-Alb och P-Krea några dagar innan infusionen.

Kontraindikationer: Graviditet och amning. Lågt calciumvärde. Gravyt nedsatt njurfunktion. Ålder <18 år. Överkänslighet mot Zoledronsyra eller annan bisfosfonat eller innehållsämne (mannitol, natriumcitrat). Aktuella tandproblem.

Infusionsdagen:

- Tag längd och vikt.
- Kontrollera att P-Ca och P-Krea ligger inom referensintervallet.
- Fråga patienten om eventuella pågående tandproblem/behandlingar.
- Ge patienten T Alvedon 500 mg 2 st eller T Ipren 400 mg
(Obs! fråga patienten om överkänslighet mot ASA).
Patienten skall ha tagit Paracetamol 500 mg 2 st 6 timmar innan besöket.
- Bjud på 2 glas dryck.
- Sätt nål.
- Starta infusion Aclasta 5 mg i färdigberedd lösning 100 ml.
Låt infusionen gå med en hastighet av 200 ml/h. Använd infusionspump.
Infusionstid skall vara minst 15 minuter. Lösningen skall ha rumstemperatur vid

användning och öppnad förpackning används genast.

- Dra nålen.
- Bjud på ytterligare 2 glas dryck.
- Kontrollera att patienten har T Alvedon 1 g x 3 eller T Iprex 400 mg 2 x 3 (om ej överkänslig) att ta samma dag och ytterligare 3 dagar.
- Eventuellt behöver patienten ökad dos av kalk och D-vitamin.
Lämna med remiss för kontroll av P-Ca, P-Alb och P-Krea efter 1 vecka.
- Informera om de vanligaste biverkningarna.
- Patienten kan sedan lämna mottagningen.
- Ta ställning till om patienten skall bokas för ny behandling om 1 år inklusive eventuell ny DEXA-mätning före behandlingen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.