

AMD - patienter som har fått behandling med anti-VEGF

Gäller för: Ögonkliniken

Efter 3:e injektionen undersökning på mottagningen.

- Visus: ETDRS och Lix
- Ev tonus
- OCT: Jämförelse med tidigare
- Dilatation med Tropikamid
- Ögonbottenundersökning: Retina intill? Linstouch?

Alt I:

Om OCT visar regress av tidigare ödem, ingen kvarvarande blödning, planeras återbesök om 4 - 6 veckor.

Alt II:

Om kvarvarande status på exudativ CNV överväga reinjektion alternativt expektans och ny kontroll 4 veckor. Om då fortsatt samma status eller sämre överväga ny injektion.

Om alt I: Månatliga kontroller (4 - 6 veckor) under 3 - 4 månader efter sista injektionen, d v s 3 kontroller i följd med ca 1 månads intervall. Om status oförändrat, visus stabilt, OCT visar ingen försämring, patienten noteras ingen försämring (metamorfopsi) planeras glesare kontroller. Nästa besök 2 - (3) månader. Om då status oförändrat återbesök 3 månader. Om status oförändrat återbesök 6 månader. Om även då oförändrat, avsluta.

Ritat schema.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.