

## BVC/Syntest vid 4-årskontroll, ögon CLV

Gäller för: Ögonkliniken

HVOT-tavlan på 3 meters avstånd

Barnet bör inte vara trött vid undersökningen.

Instruera barnet att peka på samma bokstav som undersökaren ("lika på lika").

Täck för ena ögat NOGA. Använd kompress som du tejpar diagonalt och över näsan. Om barnet vrider på huvudet kan man misstänka att barnet kikar under lappen. OBS! Ej hålla handen för ögat. Peka på enstaka bokstäver på de översta raderna och gå raskt ned till de mindre bokstäverna. Testa den maximala synskärpan, dvs. till 1.0. Minsta raden som barnet ser anger synskärpan. För att godkänna en viss rad skall i princip samtliga bokstäver vara korrekt angivna.

Synskärpa		Åtgärd vid första kontroll	Åtgärd vid omkontroll (inom 1 månader)
0,8	0,8	Ingen	Ingen
0,8	0,65	Omkontroll	Remiss
0,8	<0,65	Remiss	---
0,65	0,65	Omkontroll	Remiss
0,65	0,5	Remiss	Remiss
0,5	0,5	Remiss	---
<0,5 på endera ögat		Remiss	---

Istället för remittering kan omkontroll ske vid lägre synskärpa än vad som ovan angivits, om undersökaren misstänker att undersökningsresultatet inte speglar

barnets egentliga synförmåga.

Vid uppenbara synproblem som inte avspeglas i synskärpetesten kan remiss till ögonkliniken vara motiverad.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**