

Glasögonförskrivning barn

Glasögon övervägs till barn med

- Synnedsättning
- Astenopa besvär
- Fusionssvikt
- "Dyslexi"

Skia/refraktometri i cykloplegi mäts efter 40 min. (Ej över 60 min eftersom den cykloplegiska effekten avtar).

<4 år

Glasögon vid refraktionsfel som ger synskärpa under den för åldern förväntade.

Hyperopi - >4 dioptrier eller anisometri. Avdrag på 2 dioptrier. Vid inåtskelning ges full korrektion.

Astigmatism - $\geq -1,0$ dioptrier eller anisometri.

Myopi – fullkorrigeras.

4 år

Synskärpa 0,65 o a, omkontroll om refraktionen < +2 dioptrier. Annars glasförskrivning.

Synskärpa 0,8 o a och refraktion $\geq +2$, omkontroll vid 5 års ålder med KM-test.

5-8 år

5 år - godkänd synskärpa 0,7 o a (KM).

6 år - godkänd synskärpa 0,8 o a (KM).

7 år - godkänd synskärpa 0,9 o a (KM/bokstavstavla).

Vid ovanstående synskärpa och refraktionsfel $\geq +3$ refraktionering hos ortoptist. Vid sämre synskärpa eller sidoskillnad - glasförskrivning. Myopi och astigmatism fullkorrigeras.

Vid astenopa besvär kan glas behöva ges även på svagare hyperopi.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.