

## Glaukom - pigment dispersion syndrom

**Gäller för:** Ögonkliniken

### **Orsak:**

Pigment lossnar från iris och ger tilltäppning i kammarvinkeln vilket kan leda till ökat ögontryck med glaukom som följd.

### **Riskfaktorer:**

Ses oftast hos yngre män, närsynthet vanligt, tillfällig tryckstegring kan uppstå vid pupilldilatation och vid fysisk träning.

### **Fynd:**

Pigmentskador på iris, eventuellt pigment på endotelet, Krukenbergs spole, pigment i kammarvinkeln.

### **Symtom:**

Patienten har inga symtom, upptäcks oftast tillfälligt eller vid manifest glaukom.

### **Uppföljning och behandling:**

Vid normalt ögontryck (hos denna patientgrupp  $IOP < 21$ ) : tryckmätning hos optiker 1 gång per år. Utveckling av glaukom kan ske efter mer än 10 år.

Vid  $IOP = 21$  eller högre överväg behandling alternativt tätare tryckkontroller. Denna patientgrupp ska behandlas tidigt.

"Vanlig" droppbehandling.

SLT kan användas som komplement (OBS låg energi, kan ge trycktoppar).

Glaukomkirurgi används med vanlig indikation.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**