

Hemangiom - Propranololbehandling

Gäller för: Ögonkliniken

Vid synhotande ögonlockshemangiom: Ortoptistbedömning - sidoskillnad i visus?

Starta ocklusionsbehandling.

Remiss till barnkliniken för start av behandling med betablockare/propranolol.

Peroral Propranololbehandling:

T Inderal 10 mg, alternativt Lösning Propranolol 1 mg/ml,
i dosen 2 mg/kg/dag.

Ex: Barnets vikt 5 kg ger dosen 10 mg/dag = 5 mg x 2 = T Inderal 10 mg, ½ x 2,
eller lösning Propranolol 5 ml x 2.

Ökning med 1 ml = 1 mg för varje kg ökning i kroppsvikt.

Behandlingen pågår så länge hemangiomet tillväxer, d v s ca 1 ½ år.

Lokalbehandling med lösning Timolol ögondroppar 0,5 %, som påstrykes 2 ggr
dagl. har beskrivits ha snabb och god effekt utan biverkningar och behov av
speciell kontroll eller övervakning.

Täta kontroller hos ortoptist (visus, skelning).

Kliniska kontroller, foto.

Hemangiol:

Lösning 3,75 mg/ml

Dosering – upptrappning under någon månad:

Vecka 1 Startdos 1 mg/kg kroppsvikt och dag i 2 doser på 0,5 mg vardera i 1 vecka.

Vecka 2 2 mg/kg kroppsvikt och dag i 1 vecka

Vecka 3 3 mg/kg kroppsvikt och dag, om inga problem denna dos fortsatt som underhållsdos

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.