

Iriter/uveiter, utredning/provtagning vid inflammatoriska icke infektiösa ögonsjukdomar

Gäller för: Ögonkliniken
Faktaägare: Karin Ylvén
Cristin Holm

Indelning *uveiter*:

främre uveit

AAU (acute anterior uveitis)

CAU (chronic anterior uveitis)

intermediär uveit/pars planit

posterior uveit

panuveit

Med inflammation i ögats främre segment avses oftast *irit*, men diagnoserna keratit, sclerit, orbital inflammation (myosit), TAO, hör också hit. Okomplicerade förstagångsiriter som svarar bra på behandling utreds vanligen inte. Obs: Övriga inflammationer, se nedan, skall *utredas* avseende bakomliggande orsak. En iritattack varar 3 mån, vilket innebär slutkontroll först efter 3 mån.

Alla svåra förstagångsiriter (granulomatösa, med hypopyon)
recidiverande iriter
CAU (AAU > 3 mån)
bakre uveiter
intermediära uveiter
panuveiter

skall utredas.

1. *uteslut infektion:*

Toxoplasma/se, förhöjt IgG ej = aktivitet. (begränsat värde vid främre uveit/irit)
Borrelia serologi

Toxocara serologi (ovanlig, pars planit-bild hos barn < 10 år).

Bartonella henselae serologi (ovanlig), vid cat scratch disease/neuroretinit

lues (*treponema pallidum*, Tp). HIV samtidigt

tbc, rtg pulm, quantiferon/se. För PPD: remiss infektionskliniken. Vid klinisk misstanke om tbc, kolla både quantiferon och PPD.

Virus: CMV, HS, HZ, EBV, serologi. PCR på konjunktivalsekret. Ev PCR på främre kammarvatten (värdefullt vid ex vis misstanke om ARN)

2. provtagning, i första omgången:

SR, CRP, vita med diff, HLAB27, s-Ca, s-kreatinin. Finns som analyspaket i CC ”uveitutredning 1”. (HLAB27 av begränsat värde vid bakre uveiter, detta gäller även CCP, RF, ANA).

Mer riktad provtagning

Sarcoidos; rtg pulm/thorax. ACE-se. Lysozym-se (barn). Octreotidscintigrafi/PET-scan.

FA/ICG. Se även PM [”Sarcoidos”](#).

Behcet/vaskulit (HLAB51) Se även [”PM Behcet”](#). Vid vaskulitbild: Remiss reumatologen.

Spondylarthrit/SpA? HLAB27. Vid ryggvärk och irit, samt dessutom pos. HLAB27, ökar risken för (utveckling av) SpA – remiss reumatologen.

Mb Wegener?(ANCA: MPO, PR3)

MS ? (*Synfält, MR-plaques?*)

JLA (CCP, ANA, RF, HLAB27, lysozym-se).

3. Irit med papillödem: CNS *engagemang*? (CT, MR), ev remiss neurologen/lp.

Irit med hypopyon: Pos. HLAB27? Behcet? Endoftalmit, leukemi(recidiv)?

Provtagningspärmen

De flesta prover finns att beställa i CC.

Förteckning över övriga prover som kan vara aktuella vid uveitutredning finns i provtagningspärmen i behandlingsrummet A-sidan. Där står vilka av proverna som kan ordineras i CC – de flesta – och vilka som kräver pappersremiss och var den i så fall finns.

Ch 2020-06-30

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare