

Nevi - chorioidala

Gäller för: Ögonkliniken

Faktaägare:

Karin Ylvén

Cristin Holm

Nationella Vårdprogrammet för Maligna Melanom

PM Ögonmelanom och Ögonnevus SUS

1.1 Nevi – choroidala

6 % av befolkningen har nevus i choroidea, en på 5000 genomgår malign degeneration till choroidalt melanom.

Rent allmänt räknas *snabb tillväxt* under en kort period (månader) som ett typiskt kännetecken för choroidalt melanom.

Risikfaktorer/atypiska choroidala nevi / (= förstadier till uveala melanom):

- tumörtjocklek > 2 mm.
- orange pigment.
- frånvaro av drusen.
- synstörningar (ex metamorfopsier).
- närhet till papillen, juxtapapillära.
- subretinal vätska (förekommer ej vid benigna nevi (OCT)).
- tillväxt under kort tid (månader).
- stora (> 1 PD) med central lokalisation.

Handläggning:

- om inga riskfaktorer kan pat. släppas utan uppföljning
- om > 1 riskfaktor: ny kontroll 6 mån, foto, om oförändrat då, slutkontroll 12 mån.
- om > 2 riskfaktorer: fortsatta kontroller årsvis.
- Vid *tveksamhet* om malign transformering: *remiss* S:t Eriks för bedömning; behandling av atypiskt nevus?

PM Ögonmelanom och Ögonnevus SUS

Nationella Vårdprogrammet för melanom (2018)