

## Prolaktinom, synfältskontroller

**Gäller för:** Ögonkliniken

**Faktaägare:** Cristin Holm  
Karin Ylvén

Remisspatient från endokrinologen.

**Prolaktinom och graviditet:** På grund av tillväxtrisk under graviditet rekommenderas kontroller **avseende synfältsdefekter**.

Vid **mikroadenom** är dock risken så liten att synfältskontroller ej anses indicerade om inga visuella symtom föreligger. Mikroprolaktinom kontrolleras vid *symtom* eller om *röntgenologisk tillväxt*. (Bertil Lindblom, Göteborg).

Vid **makroadenom** är tillväxtrisken större, varför regelbundna synfältsundersökningar bör göras; 1 gång/månad (varannan månad) under hela graviditeten. Varannan/var 3:e månad under amningsperioden.

Väntelista sjuksköterska, Humphrey 30:2 alternativt Goldmann. Sjuksköterskan ger vid besöket tid för nästa undersökning. Synfälten bedöms av läkare. Inga rutinmässiga svar till patienten vid normalfynd. Vid ev. försämring informeras pat och pats behandlande läk (medklin/neurologen). SF-kontrollerna tätare.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**