

Svetsblänk, ögon CLV

Gäller för: Ögonkliniken

Svetsblänk

Keratitis electrica eller svetsblänk, snöblindhet.

Uppträder efter svetsning, sollampa, sol + snö, om ej skyddande glas har använts pga att UV-ljus absorberas ytligt i hornhinnan och förstör cellerna där med mer eller mindre utbredda sår som följd.

Läker inom något dygn om inget tillstöter.

Symtom:

Sveda, skav, tårflöde, ljuskänslighet, svårt hålla ögonen öppna, oftast är båda ögonen röda. Besvären kommer efter 6-10 tim, dvs oftast framåt kvällen/natten.

Fynd:

Rinnande, mer eller mindre ilsket röda ögon. Riklig matta av punktförmade eller sammanflytande färgbarheter vid färgning med fluorescein (remsa).

OBS! Om patienten är infekterad eller har ensidiga besvär eller kände när något kom in i ögat är det oftast annan orsak.

Råd vid säker diagnos:

1. Vid lindriga besvär – stanna hemma, avvakta till nästa dag, blunda så mycket som möjligt, ev kalla kompresser, ev Alvedon.
2. Vid måttliga och starka besvär – ge Chloromycetinsalva x 3, 1 droppe BNX (benoxinate hydrochloride 0,4 %) och ögonförband (för att håll ögat stängt), 1-2 Alvedon.

BNX får ej skickas med patienten hem, endast efter läkarordination.

Giltig fr.o.m: 2011-02-21
Giltig t.o.m: 2016-10-21
Identifierare: 50078
Svetsblänk, ögon CLV



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.