

## Tapetoretinala degenerationer

**Gäller för:** Ögonkliniken

Vid misstanke om tapetoretinal degeneration ska följande undersökningar utföras:

- Avståndssynskärpa
- Närsynskärpa
- Färgsinne
- Allmänt ögonstatus
- Synfält enligt Goldmann
- Adaptometri
- Ögonbottenfotografering (färg)

Vid oklarhet eller stärkt misstanke, remiss till Lund.

### **Behandling:**

Efter ställd diagnos skrives remiss till syncentralen.

Patienten erbjuds också behandling med Carlsson A-Vitamin 15 000 IE dagligen om inga kontraindikationer föreligger. Licenspreparat.

Innan behandling inleds och en gång årligen kontrolleras leverstatus.

Kliniska kontroller sker varje/vartannat år beroende på ålder, status med mera.

Undersökningen som då ska utföras:

- Avståndssynskärpa
- Närsynskärpa
- Färgsinne
- Synfält enligt Goldmann
- Ögonbottenfotografering (SLO)

**Länkar:**

SOTA-ärfvlga näthinnesjukdomar ([www.swedeye.org/wp-content/uploads/SotA\\_RP.pdf](http://www.swedeye.org/wp-content/uploads/SotA_RP.pdf))

Svenska RP-föreningens hemsida ([www.srpf.a.se](http://www.srpf.a.se))

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**