

## Triamcinoloninjektion

Gäller för: Ögonkliniken

### TRIAMCINOLONINJEKTION

#### KENACORT-T

Subconjunctival injektion, Kenacort T 40 mg/ml

I nedre fornix temporalt ges subconjunktivalt 0,5 ml (=20 mg)

**Indikation:** Kronisk eller svår ensidig uveit, OBS! Off label administrering!

#### Material:

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Handskar

BNX, Oxibuprokain 4 mg/ml

3 ml spruta

Rosa uppdragningskanyl

Grå kanyl (0,4 x 19 mm)

Ev pincett

Fucithalmicsalva

Injektionsvätska Kenacort T 40 mg/ml

#### Tillvägagångssätt:

Ge 1 droppe bedövning med Oxibuprokain.

Be patienten blunda.

Tvätta med Klorhexidinsprit.

Dra upp 0,5 ml av injektionsvätska Kenacort i sprutan.

Läkaren ger injektionen i nedre fornix.

Fucithalmicsalva.

Giltig fr.o.m: 2016-06-20  
Giltig t.o.m: 2021-11-12  
Identifierare: 50094  
Triamcinoloninjektion



**Efterkontroll:**

Tryckkkontroll 1 vecka efter injektionen, samt efter 2 månader.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**