

TEE + elkonvertering vid förmaksflimmer - Medicinkliniken Ljungby

Gäller för: Medicinkliniken Ljungby

Metod

Om man vid en transesofagal ekokardiografiundersökning ej hittar någon kontraindikation som t ex spontankontrast, tromb eller låg hastighet i förmaksörat, kan man göra elkonvertering samma dag d v s utan föregående Waran-behandling.

Målsättning

Minimera tiden för debuten av förmaksflimmer till förnyad sinusrytm samt minimera tiden som patienten måste vara antikoagulerad.

Patientgrupper

- Remiss från primärvård eller annan klinik.
- Patient på medicinkliniken via akutmottagningen eller från avdelning.

Kompletterande utredning

Vid misstanke om ischemisk genes och "yngre" patienter dessutom arbets-EKG i uppföljningen.

Detta är ett samarbete mellan medicinmottagningen, klinisk fysiologi och avdelning 3B/HIA. Flödesschema samt checklistor finns utarbetade för alla nivåer. För bokning ta kontakt med hjärtsjuksköterska medicinmottagningen eller BMA klinisk fysiologi.

Antikoagulantia

Om elkonvertering skall utföras efter TEE, skall TEE-ansvarig läkare ordinera Fragmin 200 IE/kg kroppsvikt/dygn tills målvärdet för INR är nått och därefter behandling med Waran i minst 3 veckor.

Giltig fr.o.m: 2007-07-01

Giltig t.o.m: 2017-07-01

Identifierare: 50553

TEE + elkonvertering vid förmaksflimmer - Medicinkliniken Ljungby



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.