

Brännskadebad på barndagvården, kirurgkliniken

Gäller för: Kirurgkliniken Växjö

Bakgrund

En viktig del av brännskadebehandlingen är att avlägsna död hud och smuts och att täcka huden för skydd och smärtlindring. Död vävnad är en grogrund för bakterier och infektion kan fördjupa skadan. På barn görs detta fördelaktigt genom att bada. Detta sker på dagbarnvården. Vid besöket badas barnet, i badet tvättas såren rena, skadade hudrester avlägsnas och förbanden byts.

Förberedelser

- Vid besöket på akutmottagningen ska ansvarig sjuksköterska eller läkare ringa till Dagbarnvården (tel 6735) och boka tid för nästa omläggning. Kommer patienten jourtid görs bokningsunderlag som vanligt.
- Omläggning bör ske med ungefär 3 dagars mellanrum
- Vid upprepad omläggning ska patienten överrapporteras till nästa veckas jourteam, alternativt till läkare på bröstsektionen.
- Badvattnet ska innehålla lämplig mängd salt (samma som kroppens egen salthalt) för att minimera obehag för patienten.

Mängd salt i vattnet

20 l: 180 g salt

30 l: 270 g salt

60 l: 540 g salt

Premedicinering

Ca en timme före badet ska barnet ha smärtstillande, tex flytande oxynorm [enligt vikt-PM](#).

20 minuter före badet ges vid behov lugnande i form av Midazolam rektalt (se tabell nedan). Barnet får därefter inte lämnas utan uppsikt. Narkosläkare på barn/öronsektionen ska vara informerande före sederingen. Ring dagen före och

bestäm tid (sekr 8319). **Ansvarig kirurgläkare (någon i det aktuella jourteamet) ska vara ansvarig och informerad.** Hos barn med upprepade omläggningar kan ansvaret ibland tas över av bröstteamet, detta för att upprätthålla kontinuiteten. Stäm av med dessa.

Vikt (kg)	Midazolam (ml)
6	0,6
7	0,7
8	0,8
9	0,9
10	1,0
11	1,1
12	1,2
13	1,3
14	1,4
15	1,5
16	1,6
17	1,7
18	1,8
19	1,9
20	2,0
21	2,1
22	2,2
23	2,3
24	2,4
25	2,5

Premedicinering med Midazolam rektalt

(Midazolam rektalgel 3.0mg/ml;0,3 mg/kg)

Vikt(kg) Midazolam(ml)

Observandum

Midazolam rektalgel och flytande Oxynorm är potenta läkemedel som inte bör utfärdas på recept till barn. Vid behov skickas enstaka doser med till hemmet i ren spruta försedd med kork

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare