

Trycksår

Gäller för: Kirurgkliniken

Definition

Ett trycksår är en lokaliserad skada i huden och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som ett resultat av tryck eller tryck i kombination med skjuv och friktion. Skjuvning är en förskjutning av vävnadslager i förhållande till överhuden. Det kan uppstå om patientens huvudända höjs och patienten glider ned i sängen. Friktion uppstår när patienten dras, och inte lyfts i sängen.

Internationell klassifikation av trycksår

Kategori I : Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående missfärgning och hel hud.

Kategori II : Delhudskada. Ytligt sår eller blåsa.

Kategori III : Fullhudskada ner till, men ej genom fascian(fett).

Kategori IV : Djup fullhudskada som involverar ben, sena eller muskel.

Mottagningsbesök

- Läkare/sårsjuksköterska bedömer om såret ska revideras.
- Patienten anmäls till akutlistan om revidering inte går att genomföra i lokalbedövning på mottagningen.
- Sårodling tas.
- Överväg VAC-behandling.
- Överväg upprepade revisioner på mottagningen.
- Vid omfattande trycksår av grad IV kan remiss till plastikkirurgen övervägas.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare