

Intravitreal injektion, Ozurdex

Gäller för: Ögonkliniken

Läkemedel

Ozurdex - förfylld injektions ampull.

Ska ej ges vid graviditet.

Material

IVT-set (custom pack)

eller

1 st mätsticka

2 st öronpinnar

blefarostat

ögonduk

tvättset

Tetrakain 1 %

Kloramfenikol 0,5 % endospipett.

Handskar

Arbetsgång

Kontrollera identitet och att rätt öga är märkt. Kontrollera även att patienten är förehandlad med antibiotika lokalt.

Bedöva med Tetrakain. Skölj konjunktivalsäck med *klorhexidinlösning 0,5 mg/ml*. Huddesinfektion med *klorhexidinsprit 5 mg/ml*. Natrimklorid 9 mg/ml vid behov.

Injektionsspetsen skall stickas in 4,0 mm posteriort om limbus in i glaskroppsrummet med riktning mot ögonglobens centrum. Ställ mätstickan enligt ordination.

Mät ut 4,0 mm. Dränk en öronpinne med Tetrakain, tryck mot bulben i 30 sekunder där injektion skall ske. Sidoförskjut konjunktiva med öronpinnen. Stick vinkelrätt mot ytan. Injicera långsamt.

Avsluta med att ge en droppe Kloramfenikol 0,5 % endospipett.