

# Ytlig tromboflebit

**Gäller för:** Kirurgkliniken

## Bakgrund

Många gånger har patienten en ytlig venös insufficiens sedan tidigare.

## Klinisk bild

Ömmande fast kärlsträng(ar) motsvarande flebiten, rodnad ibland värk.

- Låg flebit = Medialt nedanför knät
- Hög flebit = Ovanför knät

OBS! Om tromboflebit lokaliserad på baksidan av vaden kan det vara en parvaflebit som ska utredas och hanteras som en hög flebit.

## Utredning

Vid låg flebit är klinisk us oftast tillräcklig. Vid hög flebit med rodnad upp mot ljumsken ska ultraljud göras för att identifiera trombtoppen. Går den in i det djupa systemet är flebiten att betrakta som en DVT och pat ska då omhändertas via medicin.

## Behandling

- Låg flebit: Heparinoidsalvor (Hirudoid), ger ofta viss symtomlindring, ev tillägg med NSAID.
- Hög flebit: Lågmolekylärt Heparin i behandlingsdos under 10 dagar, därefter i halverad dos under 3 veckor.

## Uppföljning

- Vid låg tromboflebit: åter vb
- Vid hög flebit remiss till kärlmott.
- Vid utebliven behandlingseffekt av hög flebit kan man förlänga behandlingstiden ytterligare 2 veckor med fulldosbehandling med lågmolekylärt Heparin.

Giltig fr.o.m: 2018-12-17  
Giltig t.o.m: 2020-11-08  
Identifierare: 66357  
Ytlig tromboflebit



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela  
faktaägare