

Trombolys

Gäller för: Kirurgkliniken

Bakgrund

Intraarteriell trombolysbehandling kan vara indicerad vid olika tillstånd med trombembolisk genes, oftast arteriell embolisering eller ocklusion efter kärllrekonstruktion. Se även [PM Trombolys Kateterbaserad Arteriell](#) där även kontraindikationer finns.

Beslut om behandling tas av ansvarig kärllkirurg. I de flesta fall sker detta akut/subakut.

Vid inskrivning

- Aktivera läkemedelslista
- Fastande, kan dock tillåtas trivseldryck, 500 ml enl PM
- KAD
- Metformin sätts tillfälligt ut
- Angioremiss utfärdas om sådan inte finnes
- Ansvarig IVA läkare kontaktas av kärllkirurg, behandling och övervakning sker på IVA.
- Rapport till ansvarig IVA sköterska av kärllkirurg.
- Trombolys kvar under trombolysbehandling.

Blodprover

Blodstatus, blodgruppering, elstatus, P-glu hos DM, PK, APT, samt BASTest. Behandlingsstart kan ske innan BASTest är klar.

Läkemedel

Plasminogenaktivator, leder till fibrinolys. Administrerars lokalt via intraarteriell placerad kateter. Vi använder **Actilyl**, detta finns på IVA. Spädning enligt [PM Trombolys Kateterbaserad Arteriell](#). Heparin ges i separat infart, introducern, för att undvika ocklusion kring trombolyskatetern.

Dosering

Dosering sker skriftligt av kärlkirurg på särskilt doseringsschema.

Kontroller

- Puls/blodtryck, kontinuerlig
- Instickställe 2-3 ggr/tim
- Perifert cirkulationsstatus dokumenteras 1 gång/tim
- Hb 4ggr/dygn
- Timdiures
- Röntgenkontroller sker oftast 4-12 tim efter uppstart, på Rtg lab 13, ordineras av kärlkirurg på ordinationsschema.

Komplikationer

I huvudsak blödningskomplikationer, mest allvarliga är retroperitonella blödningar samt CNS blödningar.

Behandlingstid

Helt beroende av hur trombolysen fortskrider, men sällan >48 tim.

Avslut

Sker på Angiolab där kateter avlägsnas och kärlförslutning anbringas. Patienten kan därefter transporteras direkt till avdelning 33.

Efter behandling

- Fortsatta kontroller enl Angio Vård-PM, rubrik "Efter behandlingen"
- Lågmolekylärt Heparin, oftast Klexane 40 mg sc x1, under minst 5 dygn.
- Trombyl 75mg insättes om ej tidigare ordinerat

Uppföljning

Efter 1 mån kontroll på kärilmott.

Giltig fr.o.m: 2021-04-16
Giltig t.o.m: 2024-04-16 00:00:00
Identifierare: 66358
Trombolys



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare