

## Indikationer gällande utprovning av kompressionsstrumpor klass 2

Gäller för: Kirurgkliniken

- Posttrombotiskt syndrom där klass 1-strumpa inte har gett tillräcklig effekt.
- Djup och ytlig venös insufficiens med bensvullnad och hudförändringar där eventuella kirurgiska åtgärder och/eller klass 1-strumpa inte gett tillräcklig effekt.
- Lymfödem i kombination med lymfödemterapi (utprovning sker då via fysioterapi)
- Bensvullnad av annan genes (t ex. hjärtsvikt) där klass 1-strumpa inte har gett tillräcklig effekt.
- Utprovning av klass 1-strumpor kan även göras om patientens habitus medför att det är svårt att hitta klass 1- strumpor som passar.

### Observera

En klass 1-strumpa kan alltid användas utan cirkulationsutredning såvida inte patienten också har sår eller andra kliniska tecken på kritisk ischemi i t ex. vilovärk. Då rekommenderas remiss till kärlsektionen för bedömning.

Ibland efterfrågas höga klass 1–strumpor, dessa finns att köpa på vissa apotek.

Utprovning av kompressionsstrumpor ska om möjligt, som tidigare, skötas av distriktssköterska på vårdcentral. Vid behov skrivs remiss till kärlsektionen.

En utprovad kompressionsstrumpa innebär alltid en större kostnad för patienten än om man köper dessa själv på apotek. En klass 2-strumpa är ibland besvärlig för patienten att använda vilket kan leda till dålig compliance.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare