

Ultraljud, uppföljning av checklista

Organ	Undersökningsfynd	Ej sedd	Kommentar
Skallform	Normal form	Åter till undersökaren	Om då ej sedd till läkaren
	Lemonsign		Åter läkare ≤ 1 v
	Strawberry sign		Åter läkare ≤ 1 v
Hjärnventriklar	>10 mm	Åter undersökare	Om då ej sedd till läkare Till läkare ≤ 1 v.
Cerebellum	Timglasform	Åter till undersökaren.	Om då ej sedd till läkare
			Till läkare ≤ 1 v.
			Till läkare ≤ 1 v.
Ansikte	Ögonhålör	Åter till undersökaren	Om ej sedd till läkaren
	Näsben	Ej åter	Om säker att det saknas åter läkare ≤ 1 v
	Läppar	Ej åter	Om säker att det saknas åter läkare ≤ 1 v
	Läppspalt		Åter läkare ≤ 1 v
Columna	Om möjligt: lateral-, sagital-, frontalsnitt	Åter till undersökaren	Om ej sedd till läkaren
Hjärta	Perikardvätska		Åter läkare ≤ 1 v

Hjärtats storlek	Mindre än 1/3 av thorax Mer än 1/3 av thorax		Åter läkare ≤1 v Åter läkare ≤1 v
4-kammarbild	suboptimal bedömning Avvikelse	Åter till undersökaren	Om ej sedd till läkare Åter läkare ≤1 v
Stora kärl/utflöden	suboptimal bedömning	Åter undersökare	Om ej sedd till läkare
3-kärlsbild	Ej sedd suboptimal bedömning Avvikelse	Åter undersökare	Åter läkare ≤1 v Om ej sedd till läkare Åter läkare ≤1 v
Thorax	Suboptimal bedömning Avvikelse	Åter undersökare	Om ej sedd till läkare Åter läkare ≤1 v
Lungor	Avvikelse		Åter läkare ≤1 v
Diafragma	Suboptimal bedömning Avvikande	Åter undersökare	Om ej sedd till läkare Åter läkare ≤1 v
Ventrikel	Vänster sida/normal storlek Avvikande	Åter till undersökaren	Om ej sedd till läkaren Åter läkare ≤1 v
Bukvägg	Navelsträngsfästet	Åter till undersökaren	Om ej sedd till läkaren

	Avvikande		Åter läkare ≤1 v
Njurar	2 st njurbäcken:	Åter till undersökare	Om ej sedd till läkare
	Njurbäcken ≥6mm	Åter till undersökaren v 32, se vidare särskilt PM	
	Vid njurbäcken ≥10 mm		Åter läkare ≤ 1 v
Urinblåsa	Suboptimal bedömning	Åter till undersökaren	Om ej sedd till läkare
	Storlek ≥15 mm, alt. ej över navelsträngsfäste i sagital vy	Åter till undersökaren	Om fortfarande för stor åter läkare ≤ 1 v
Extremiteter	Armar/händer	Åter undersökare	Om då ej sedd till läkare
	Avvikelse		Till läkare ≤1v.
	Ben/fötter	Åter undersökare	Om då ej sedd till läkare
	Avvikelse		Åter läkare ≤ 1 v
Navelsträng	3 kärl		Om ej sedd till läkare
	2 kärl	Åter till undersökare	Om säkert inget annat fel åter v 30, tillväxt. Annars läkare <2v

	Misstänkt hinnfäste		Till läkare v, 24
Placenta	Placering		
	Lågt sittande, ≤ 20 mm över imm		Till BM v.30 för kontroll om ej riskfaktorer
	Skålformat ≥ 20 mm över imm		Till läkare v.24
	Lågt sittande framväggsplacenta och tidigare sectio.		Till läkare v.24
	Misstanke om mola		Till läkare ≤ 1 v.
Fostervatten	Normal mängd, se pm		
	Avvikande		Åter läkare ≤ 1 v
Fosterrörelser	Tillräckliga		
	Avvikande	Åter till undersökaren	Om fortsatt samma bedömning - till läkare ≤ 1 v
Cysta/myom	Normal oförändrad storlek från tidigare ultraljud.		
	Avvikande storlek och placering		Till läkare för bedömning mellan gravv. 24-28

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare