

# Akuta läkemedel och utrustning inom primärvården

Gäller för: Region Kronoberg

**Faktaägare:** Erik Falk, överläkare akutkliniken  
Roland Olofsson-Dolk, AMK  
Kerstin Cesar, sjuksköterska ProACTcourse/KTC  
Pär Lindgren, chefläkare Region Kronoberg  
Olle Bergström, överläkare medicinkliniken

## Innehåll

1	Akutvagn .....	2
1.1	Låda 1 – Läkemedel .....	3
1.2	Hjärtlåda i Låda 1 .....	4
1.3	Låda 2 – Fri venväg + DE .....	4
1.4	Låda 3 – Fri luftväg .....	4
1.5	Låda 4 – B+C .....	5
2	Övrig utrustning vagn .....	5
3	I vanligt läkemedelsförråd i låda märkt akutläkemedel .....	6

## 1 Akutvagn

Alla vårdcentraler bör ha en akutvagn. Det finns en beskrivning med fotografier på hur utrustningen skall organiseras.

För att undvika risk att nyckeln glöms i ett akut läge rekommenderas att denna hängs på en krok i näst översta lådan, alternativt att vagnen låses upp varje morgon och att nyckeln sitter i. De läkemedel som finns i vagnen är så liten mängd att risken med att inte komma åt läkemedel i ett akut läge väger tyngre än risken att någon obehörig stjälar läkemedel.

En bläddermapp med indikationer och enkla steg för steg instruktioner för respektive läkemedel tas fram samt enkla steg för steg manualer för omhändertagande och läkemedelsbehandling av de mest akuta tillstånden ska finnas i akutvagnen.

Inom primärvården rekommenderar **EJ** intraosseösa nålar, intubationsutrustning eller larynxmask. Om en enhet trots det väljer att ha något av detta måste personalen ha dokumenterad utbildning och det skall ingå i övningar som görs. Årlig färdighetsträning på KTC för berörd personal är ett måste.

Nödtrakeotomi/koniotomi skall **EJ** utföras på vårdcentral och utrustning för detta skall inte finnas. De enheter som har utrustning för detta skall kassera / återlämna denna. Syrgasgrimma utgår, istället används öppen mask till alla patienter. Grimma bör inte finnas på vc.

## 1.1 Låda 1 – Läkemedel

Läkemedel	Antal	Kommentar
Adrenalin injektion 0,1 mg/ml	2 amp à 10 ml	(om A-HLR, utgår annars)
Adrenalinpenna, injektion (Emerade, Jext) 150 mikrog	2 st + 2 st i vanligt läkemedelsförråd	0-ca 10 år (30-40 kg) Anafylaxi
Adrenalinpenna Injektion (Emerade, Jext) 300 mikrog	1 st+1 st i vanligt lm- förråd	>10 år (>30-40 kg) Anafylaxi
Atropin injektion 0,5 mg/ml	2 amp à 1 ml	Bradykardi
Betapred injektion 4 mg/ml	2 amp à 1 ml	Anafylaxi
Cordarone injektion 50 mg/ml	3 amp à 3 ml	(om A-HLR, utgår annars) – ges outspätt till vuxen patient
Glucagon injektion, förfylld spruta 1 mg	2 förfyllda sprutor	(hypoglukemi)
Glukos injektion 300 mg/ml	2 ampull à 10 ml	(ytterligare amp i vanligt lm-förråd)
Buccolam (midazolam) munhålelösning, förfylld spruta 5 mg, 7,5 mg och 10 mg	1x5 mg, 1x7,5 mg 1x10 mg	för buccal adm (efter vikt)
Natriumklorid injektion 9 mg/ml	2 amp à 20 ml	för spolning och ev spädning
Naloxon injektion 0,4 mg/ml	2 amp à 1 ml	Antidot opiater ffa vid iatrogen andningsdepression
Sprutor, kanyler, etiketter för sprutmärkning etc		

## 1.2 Hjärtlåda i Låda 1

Läkemedel	Antal	Kommentar
Morfin injektion 10 mg/ml	2 amp à 1 ml	Bröstsmärta
Nitrolingual spray 0,4 mg/dos	1x200 doser	Akut koronart syndrom
Metoprolol (Seloken) injektion 1 mg/ml	2 amp à 5 ml	Akut koronart syndrom + takykardi o/e hypertension
Acetylsalicylsyra (Trombyl) tablett 75 mg	4 tabletter	Akut koronart syndrom
Alla läkemedel bör finnas med minst 2 st i akutvagn i händelse av att en går sönder/spills ut. I övrigt bör påfyllning finnas i vanligt läkemedelsförråd men inga extra i akutvagn.		

## 1.3 Låda 2 – Fri venväg + DE

		Kommentar
Perifer venkateter (PVK)	(0,7 0,9 1,1 och 1,3)	
Tillbehör venkateter ex fästmaterial, anslutningar, ev 3-vägskran		
Ficklampa		
Reflexhammare		
Pulsoximeter		(barn+vuxen)

## 1.4 Låda 3 – Fri luftväg

		Kommentar
Nasofaryngealtub (näskantarell)	nr 28 och 32 2 av varje	
Gel till näskantarell		
Svalgtuber		(sortimentlåda)
Magills tång		(om det finns laryngoskop – inga nyinköp av laryngoskop magills tång utgår om laryngoskop ej finns)
Tillbehör till ev laryngoskopandtag – blad vuxen och barn, batterier vid sidan av ej i skopet		

## 1.5 Låda 4 – B+C

		Kommentar
Pocketmask med syrgasnippel		vuxen och barn
Mask och blåsa (engångs)		barn och vuxna (olika maskstorlekar finns i resp förp)
Reservoarmask		vuxen och barn
Öppen mask (oxymask)		vuxen och barn O2 1L-15 L/min
Blodtrycksmanchett		vuxen+ barn
Stetoskop		

## 2 Övrig utrustning vagn

Defibrillator med tillbehör	(rakhyvel, vuxenplattor pappershandduk etc) på antiglidplatta på bordet
Handsprit	
Sprittork	
Tejp + kompresser + plåster etc	
Liten stickande/skärande avfall	
Ev liten övrigt avfall	
Droppkrok med Ringeracetat infusion 1000 ml	
Sugkatetrar Nr 8 och 14	2 st av varje i avsett ställ på sidan
Sug skall finnas på akutrum – om ny måste köpas in rekommenderas upphandlad modell med uppladdningsbart batteri som kan monteras på sidan av vagnen. Skall vara kopplad och klar att använda när sugkateter kopplats på.	
Bläddermapp med LM-info, behandlingspm etc enl ovan.	
Ev handskhållare med engångshandskar stl s, m, l samt engångsförkläden	
Skyddsglasögon	
Munskydd	
Akutjournal+HLR-lathund	
Oxygentub	(på vc skall finnas oxygen för upp till 1 h adm med 15 L/min)
Nalle/Gosedjur	
Penna och anteckningsblock	
Klädsax	

### 3 I vanligt läkemedelsförråd i låda märkt akutläkemedel

Läkemedel		Kommentar
Adrenalin injektion 1 mg/ml	1 ml	(för inhalation)
Betapred tablett 0,5 mg	10 tabl	(Allergi)
Combivent (ipratropium/salbutamol) inhalation 0,5mg/2,5 mg	2,5 ml	(för inhalation)
Ventoline (salbutamol) inhalation 5 mg/ml	20 ml	(för inhalation)
Glukos injektion 300 mg/ml	10 ml	(hypoglukemi)
Voltaren (diklofenak) injektion 25 mg/ml	3 ml	(njursten)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.