

## Remicade/Remsima, förberedelser och kontroller vid administrering (reuma)

Gäller för: Reumatologmottagningen Växjö

### Förberedelser på reumatologmottagningen

1. Läkaren ger en första information om behandlingen i samband med läkarbesök. Patienten remitteras till infektionsmottagningen inför behandlingsstart för tuberkulosutredning och pneumokockvaccin. Screening för blodsmitta och quantiferon tas i samband med läkarbesöket. Remiss för lungröntgen utfärdas.
2. Kontroll av längd och vikt.
3. Läkaren ordinerar Remicade/Remsima/Inflectra i Cosmic.

### Förberedelser på dagvården inför Remicade/Remsima/Inflectra infusion

1. Sjuksköterskan har telefonkontakt med patienten inför behandlingen och bokar tid för första infusionen samt gör notering i konsultläkarens tidbok.
2. Patienten uppmanas att ta reumabas prover 3-7 dagar innan behandling.
3. Kontrollera provsvar. Om något är avvikande, tar sjuksköterska kontakt med konsultläkaren och ringer patienten för att förhöra sig om allmäntillståndet och eventuella infektionstecken.

### Förberedelser och administrering av Remicade/Remsima/Inflectra infusion

1. Läkaren träffar patienten på dagvården vid första infusionstillfället. Vid efterföljande behandlingstillfällen fyller patienten i ”Sökerhetsformulär för

patienter med antireumatisk behandling”. Konsultläkaren kontaktas vid behov.

2. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
3. Mät blodtryck, puls och temp. Vid första infusionstillfället kontrolleras blodtrycket även under och efter infusionen.
4. Infusion Remicade/Remisma/Inflectra bereds och administreras enligt produktresumén
5. Använd codanfiltret som kopplas på infusionsaggregatet.
6. Under infusionen bör patienten hållas under uppsikt med avseende på infusionsreaktioner. Patienterna bör informeras om tidiga tecken på dessa reaktioner, så att de själva kan vara observanta och meddela sjuksköterskan (eller annan vårdpersonal).
7. Boka patienten för nästa behandling och beställ reumabas prover.

### Infusionerna ges enligt följande intervaller:

Infusion nr 1 ges vecka 0

Infusion nr 2 ges vecka 2

Infusion nr 3 ges vecka 6

Infusion nr 4 ges vecka 14

Följande infusioner ges var 8:e vecka om inte läkare ordinerar annat

- Infusion nr 1, 2 och 3      Infusionen ges under 2 h  
   Observationstid 1 h efter avslutad infusion
- Infusion nr 4                      Om tidigare infusioner gått in u a:  
   Infusionen ges under 1 h  
   Observationstid 1 h efter avslutad infusion
- Följande infusioner              Om tidigare infusioner gått in u a:  
   Infusionen ges under 1 h  
   Patienten kan gå hem direkt  
   efter avslutad infusion

Den perifera venkatetern bör vara kvar, tills patienten lämnar dagsjukvården.

I samband med besöket lämnas ev meddelande till läkare för att skriva t ex remisser och recept.

### [Åtgärder vid infusionsreaktioner i samband med infusion](#)

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**