

Sendoxaninfusion, rutin

Gäller för: Reumatologmottagningen Växjö

Förberedelser på reumatologmottagningen

1. Läkaren ger en första information om behandling i samband med läkarbesök.

Förberedelser på dagvården

1. Sjuksköterska tar telefonkontakt med patienten och bokar tid för första Sendoxanbehandlingen, informerar om hur lång tid behandlingen tar och om provtagning samt skickar kallelse. Gör notering i konsultläkarens tidbok.
2. Patienten ska ta prover 2 dygn före behandling: blodstatus, diff, leverstatus, elstatus, CRP, SR och urinsticka. Vid njurengagemang tas även U-albumin/kreatininkvot.
3. Kontrollera provsvar. Om dessa är avvikande tar sjuksköterska kontakt med patienten för att förhöra sig om allmäntillstånd och eventuella infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterskan konsultläkaren.

Förberedelser och administrering av Sendoxaninfusion

1. Mät blodtryck, puls, temp, längd och vikt.
2. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter. Koppla spoldropp NaCl 9 mg/ml, 500 ml.
3. Läkaren träffar patienten på dagvården och ordinerar Sendoxan i cytodos. Infusion Solu-Medrol ordineras i enskilda fall som då ges under 30 minuter, ordineras i cosmic. Ge Ondansetron, enligt ELAS.
4. Strax före infusion Sendoxan ges injektion Uromitexan. Infusion Sendoxan ges under 2 timmar. Ge samtidigt infusion NaCl 9 mg/ml 500ml, denna infusionen pågår i 4 timmar. Injektion Uromitexan ges även 4 timmar efter Sendoxanstart. Tablett Uromitexan skickas med patienten hem att ta 8 timmar efter Sendoxan-start. Dessa läkemedel signeras i ELAS.

5. Informera patienten om att det är viktigt med riklig dryck under behandlingsdygnet.
6. Sendoxanprover tas 1 vecka efter behandlingen: reuma-cytostatikaprover och urinsticka.
7. Notera nästa behandling i konsultläkarens tidbok. Provtagning 2 dagar före nästa behandling: reuma-cytostatikaprover och urinsticka. Vid njurengagemang tas även U-albumin/kreatininkvot.
8. De första 3 infusionerna ges varannan vecka därefter ges behandlingen var tredje vecka. Behandlingen ges i 10 kurer.
9. När hela Sendoxanbehandlingen är avslutad och om patienten planeras för Imurelbehandling, tas TPMT-prov. ANCA C + P prov tas 1 vecka efter avslutad behandling.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.