

RoActemrainfusion, rutin

Gäller för: Reumatologmottagningen Växjö

Förberedelser på reumatologmottagningen

1. Läkaren ger en första information om behandlingen i samband med läkarbesök. Patienten remitteras till infektionsmottagningen inför behandlingsstart för tuberkulosutredning. Screening för blodsmitta och quantiferon tas i samband med läkarbesöket.
2. Kontroll av längd och vikt.
3. Läkaren ordinerar RoActemrainfusion i Cosmic.

Förberedelser på dagvården inför RoActemrabehandling

1. Sjuksköterska har telefonkontakt med patienten och bokar tid för RoActemrabehandling. Informerar om hur lång tid behandlingen tar och om provtagning samt skickar kallelse. Gör notering i konsultläkarens tidbok.
2. Patienten uppmanas ta prover: RoActemra/cytostatika prover och lipidstatus.
3. Kontrollera provsvar. Om något är avvikande tar sjuksköterska kontakt med patienten för att förhöra sig om allmänstillstånd och eventuella infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterska konsultläkaren.

Förberedelser och administrering av RoActemrainfusion

1. Läkaren träffar patienten på dagvården vid första infusionstillfället.
2. Vid efterföljande infusioner fyller patienten "Säkerhetsformulär för patienter med antireumatisk behandling". OBS! CRP kan vara lågt på dessa patienter trots pågående infektion.
3. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
4. Mät blodtryck, puls och temp.
5. RoActemra skall vara rumstempererat.
6. Beredning av RoActemra enligt produktresumé. Vagga försiktigt infusionspåsen för att undvika skumbildning.

7. RoActemrainfusionen skall ges under 1 timme.
8. Kontrollera puls och blodtryck efter avslutad infusion.
9. Boka patienten för nästa behandling och beställ RoActemra/cytostatika prover. Lipidstatus ska tas inför 3:e behandlingen.
10. RoActemra-infusion ges med 4 veckors intervall.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.