

Bröstmjölksgivare - rutin

Neonatalavdelning 10 tar emot bröstmjolk från givare som längst tre månader efter barnets födelse efter godkända blodprover på mamma och bakterieodling på bröstmjölken.

Förberedelse av givare

- Hälsodeklaration- frågefomulär.
- Informera om handhygien vid urpumpning.
- All givarmjolk ska vara urpumpad med elektrisk bröstmjölkspump.
- Hyra av bröstmjölkspump är gratis under givarperioden. Läs mer i Medelas pärm angående hyresförfarande.
- Lämna ut bröstmjölkspumpen samt extra pumpflaskor.
- Informationsbroschyren ”Till dig som vill bli bröstmjölksgivare”.
- Lämna ut frysförpackningar och etiketter.
- Lämna ut en handspritflaska.

Ta blodprover på tänkt bröstmjölksgivare

- Beställs via Mikrobiologen – Sök ”bröstmjölksgivare” så att du får med (HIV, Hepatit B och C) samt HTLV antikroppar.
- Mamman tar provet på kem lab, vi skickar med provtagningsunderlag och etiketter enligt ovan.
- Avkoda inte identiteten, använd fullständigt personnummer.
- Skriv i anamnesen ”bröstmjölksgivare”.

Ta emot leverans av givarmjolk till avdelningen

- Inspektera den lämnade mjölken. Se till att bröstmjölken är märkt och att den inte har tinat på vägen eller att burkar är trasiga.
- Väg in mjölken och fyll i bröstmjölksfakturan.
- Lämna ett kvitto till bröstmjölksgivaren, kvitto finns i mjölkkökets vägghylla.
- Fråga mamman om hon behöver fler frysburkar.
- Är det sista lämningen?
 - Ta emot pumpen.

- Lämna en anteckning i bröstmjölksgivarmappen att det är sista leveransen så att mamman sedan får sina pengar.
- Ställ in bröstmjölken i frys märkt opastöriserad bröstmjolk, samlat i en påse.
- Ta bakterieodling på mjölken.
 - Ta minst 1 ml bröstmjolk i ett odlingsrör.
 - Skicka till mikrobiologen för odling.
 - Välj övriga undersökningar ”Bröstmjolk”.
 - Skriv i remissen under anamnes ”Tänkt bröstmjölksgivare. Växt?”
- Provet lämnas på vardagar före kl 12.
- Bröstmjölksodlingen svaras ut som acceptabel eller ej acceptabel.
- Svaret vidimeras av läkare i Cambio Cosmic.

Referenser

Bröstmjolk för livet. Skånes universitetssjukhus, Malmö: Milknet; 2012. Hämtad den 30 juni, 2017 från: www.brostmjolkforlivet.se .

Riktlinjer för bröstmjolkshantering inom neonatalvården i Sverige, version 3.0, Milknet, 2016. Svenska Neonatalföreningen inom Svenska Barnläkarföreningen: Hämtad den 30 juni, 2017 från: [www.barnlakarforeningen.se /wp-content/uploads/sites/14/2014/03/brmj-hantering_2016.pdf](http://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2014/03/brmj-hantering_2016.pdf).

SOSFS 1987:8. Användning av bröstmjolk. Hämtad den 30 juni, 2017 från: [www.socialstyrelsen.se /publikationer1987/1987-10-8](http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1987/1987-10-8)

Vårdhandboken, Bröstmjolkshantering. Hämtad den 30 juni, 2017 från: [www.vardhandboken.se /Texter/Bröstmjolkshantering/Fran-givare/](http://www.vardhandboken.se/Texter/Bröstmjolkshantering/Fran-givare/)