

Droppbehandlingar

Gäller för: Förlossningsavdelningen

Utförs på: Förlossningen

Faktaägare: Maud Carlfalk

Bricanyl (för tokolys)

Blandning 5 ml Bricanyl 0,5 mg/ml i 500 ml Glukos 50 mg/ml

Initial dosering 120 ml/tim

Tractocile (för tokolys, efter injektion av bolusdos)

Blandning 10 ml (= 2 ampuller) Tractocile 7,5 mg/ml i 90 ml NaCl 9 mg/ml

Initial dosering

högdos 24 ml/tim

lågdos 8 ml/tim

Nepresol (för akut blodtryckssänkning)

Blandning 1 torrampull löses i medföljande 2 ml vätskeampull = 25 mg Nepresol i 500 ml NaCl 9 mg/ml **Initial dosering** 30 ml/tim

Magnesium (för krampprofylax-behandling)

Ge först en **bolusdos** – en glasampull Magnesiumsulfat 17,5 mmol/35 ml alternativt Addex Magnesium 2x10 ml (=20 mmol) som spädes i 20 ml NaCl 0,9% till 40 ml . Båda alternativen ges intravenöst långsamt under ca 5 minuter

Droppblandning 5x10 ml AddexMagnesium 1 mmol/ml i 450 ml Glukos 50 mg/ml

Initial dosering 40 ml/tim

Syntocinon/Oxytocin (för värkförstärkning)

Blandning 1 ml Syntocinon/Oxytocin 8,3 µg/ml i 500 ml Glukos 50 mg/ml

Initial dosering 20 ml/tim

Syntocinon/Oxytocin (efter partus vid blödning, atoni)

Giltig fr.o.m: 2020-08-12

Giltig t.o.m: 2022-08-12

Identifierare: 77297

Droppbehandlingar



Blandning 6 ml Syntocinon/Oxytocin i 8,3 µg/ml i 500 ml NaCl i 500 ml NaCl 9 mg/ml **Initial dosering** Enl ordination, max 900 ml/tim

Prostinfenem (efter partus vid blödning, atoni)

Blandning 1 ml Prostinfenem 0,25 mg/ml i 500 ml NaCl 9 mg/ml

Initial dosering 60 ml/tim

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare