

Giltig fr.o.m: 2020-03-23

Giltig t.o.m: 2022-04-01

Identifierare: 77411

Läkemedel vid dialys. Patientinstruktion.



Klorhexidinsprit 5 mg/ml:

Desinfektionsmedel för hud.

Förvaring: I rumstemperatur.

Hållbarhet: Öppnad flaska är hållbar i 1 månad.

Övriga läkemedel som kan ges i samband med dialysbehandling.

Venofer®

Ett läkemedel som ger extra järntillskott.

Läkemedlet skall ges långsamt ca 1 ml/min. Det kan ges före, under eller efter behandling.

Första dosen av läkemedlet skall ges på sjukhuset.

Läkemedlet ges i venslangen före eller på luftvakten. Använd en luerlockspruta.

Eller kan läkemedlet ges direkt i nålen/skänkeln. Flusha nålen med NaCl 9 mg/ml så inget läkemedel blir kvar i slangen.

Förvaring: I rumstemperatur.

Hållbarhet: Öppnad ampull skall användas genast.

Etalpa®

Läkemedel vid brist på aktivt D-vitamin.

Läkemedlet ges direkt i nålen/skänkeln. Flusha nålen med NaCl 9 mg/ml så inget läkemedel blir kvar i slangen.

Förvaring: Förvara ampullerna i kartongen i kylskåpet.

Hållbarhet: Öppnad ampull skall användas genast.