

Behandling av febril urinvägsinfektion hos barn

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Martin Andersson, distriktsläkare vårdcentralen Lessebo
Linda Wigh, överläkare Barn- och ungdomskliniken

Bakgrund

Tillgången till förstahandsmedel vid behandling av febril urinvägsinfektion hos barn är begränsad: ceftibuten och cefixim finns endast på licens, vilket i praktiken omöjliggör akutbehandling på recept. Genom generell licens sker därför rekvisition till barnakuten i Växjö.

Urinodling skall alltid göras. Välj urinodling med ”snabbresistens”, vilket ger slutsvar redan nästa dag om odlingen kommit fram till laboratoriet innan kl 16.00 (vardagar) eller kl 13.00 (helger/helgdagar).

Följande rutin/vårdöverenskommelse gäller för barn med misstänkt febril urinvägsinfektion i primärvård:

- Barn < 2 år remitteras akut till barn- och ungdomskliniken
- Barn ≥ 2 år med allmänpåverkan remitteras också akut till barn- och ungdomskliniken.
- Barn ≥ 2 år som är opåverkat:
 - Ansvarig läkare kontaktar primärjour på barnakuten, tel. 8442, enas om preparat och vårdnivå. Om behandling i öppenvård är aktuell, ordinerar ceftibuten/cefixim (ej recept) i Cosmic (licensläkemedel finns under ”icke godkända läkemedel”). Läkemedlet hämtas sedan av målsman på barnakuten i Växjö (efter telefonkontakt med barnakuten, tel. 8444). Följ upp behandlingseffekten.
- Samtliga barn med febril urinvägsinfektion remitteras för poliklinisk uppföljning vid barn- och ungdomskliniken.

Tag gärna telefonkontakt och diskutera med primärjour på barnakuten tel. 8442!

Rutinen är framtagen i samarbete mellan barn- och ungdomskliniken, medicinsk grupp infektion, klinisk mikrobiologi, läkemiddelskommittén och läkemedelsenheten.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.