

Diabetes mellitus - blodsocker och insulinordinationslista till inneliggande barn och ungdomar

Patientuppgifter

Datum:.....

- **Måltidsinsulin NovoRapid**

Uträknade kolhydratkvoter (frukost 350-regeln, övriga 500-regeln)

(= Antal gram kolhydrater som 1 E Novorapid tar hand om)

Frukost _____ g/E Övriga måltider _____ g/E Sign läk: ____

När ska blodsocker korrigeras?

Om blodsockret överstiger 10 mmol/L de första 24 timmarna. Därefter ges korrigerings dos om blodsockret överstiger 8 mmol/L (efter måltid ska det ha gått minst 2 timmar).

Blodsockermål vid korrigerings dos är 6 mmol/L.

- **Uträknade korrigeringskvoter** (100-regeln)

(= Hur mycket 1 E Novorapid sänker blodsockret)

OBS! Korrigeringsdos får inte tas tätare än med 2 timmars mellanrum

Korrigeringskvot: _____ mmol/L/E

Maximal korrigeringsdos (0,1 E/kg): _____ E Sign läk: _____

- **Långtidsverkande insulin Levemir**

Morgon (kl. 08): _____ (E) Sign läk _____ Sign ssk/kl. _____ / _____

Kväll (kl. 20): _____ (E) Sign läk _____ Sign ssk/kl. _____ / _____

Giltig fr.o.m: 2020-11-30

Giltig t.o.m: 2022-12-01

Identifierare: 81213

Diabetes mellitus - blodsocker och insulinordinationslista till ineliggande barn och ungdomar



REGION
KRONOBERG

Kl.	Blsr	Sensor	Korr. dos(E)	Kolhydrat- mängd (g)	Måltidsdos (E)	Druvsocker 1tabl/20kg	Övrigt	Sign ssk	
Totalt insulin under dygnet:			NovoRapid _____ E + Levemir _____ E =				Totalt: _____ E		

Observera: Annan blankett finns för utskrift till avdelningsarbetet! (G/data/ansvarsområde/diabetes).