

Rutin
Process: 3.3.4 RGK Bedriva specialiserad somatisk slutenvård
Område: Förlossning
Giltig fr.o.m: 2020-08-13
Giltig t.o.m: 2022-08-13
Faktaägare: Maud Carlfalk, Överläkare förlossningen
Fastställd av: Jennie Ronéus, Verksamhetschef
Revisions nr: 3
Identifierare: 82130



Övervakning efter sectio i spinal som kompletterats med fentanyl

Gäller för: Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

När allting är u.a efter kejsarsnitt och patienten bedöms stabil överförs patienten till Förlossningen postoperativt. Patienten övervakas sedan, förutom vanlig övervakning efter förlossning – kejsarsnitt, med vakenhet och kontroll att patienten andas bra 1 gång per timme i totalt 4 timmar från det att bedövningen anlagts. Om problem med vakenhet eller andning tas kontakt med anestesilog.

Behov av kompletterande smärtlindring med morfinpreparat, Ketogan eller liknande, bedöms vara mindre än utan Fentanyl. Om dessa måste ges inom 4 timmar efter att bedövningen anlagts ska ovanstående kontroll inklusive vakenhet - andning göras var 30:e minut.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare