

Voltaren - Diklofenak Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Diklofenak, injektionsvätska (25 mg/ml)

Indikationer

- Akuta stensmärter vid känd stensjukdom

Kontraindikationer

- Ulcus ventriculi/duodeni
- Svår hjärtsvikt
- Njursvikt
- Leversvikt
- Graviditet
- Överkänslighet mot ASA eller NSAID
- Koagulationsrubbning
- Hypotension

Dosering

- **Inj. Diklofenak 25 mg/ml**, 2-3 ml i.m. (injiceras i gluteal- regionens övre laterala kvadrant djupt intramuskulärt)

Försiktighet

- Inflammatorisk tarmsjukdom
- Astma
- Äldre patienter, välj lägre dosen (2ml)
- **Fråga aktivt om patienten redan tagit NSAID. Tidpunkt? Dos?**

Biverkningar

- Huvudvärk, yrsel
- Illamående, kräkningar, buksmärtor
- Anafylaxi
- Bronkospasm

Överdoser

- Överdoser kan ge symtom såsom illamående, kräkningar, buksmärtor, gastrointestinala blödningar, diarré, yrsel, somnolens, tinnitus, oro, hallucinationer, njurpåverkan, leverpåverkan, ödemtendens, eventuellt metabolisk acidosis eller kramper.

Interaktioner

- Undvik samtidig behandling med **Waran/NOAK**

Tänk på

- Ge kristalloid lösning i.v. till patienter med misstänkt vätskebrist om Diklofenak ges
- Äldre patienter, ge lägre dosen

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare