

Nepresolbehandling

Faktaägare:

Vid preeclampsi eller hotande eclampsi där behov av snabb blodtryckssänkning eftersträvas kan Nepresol intravenöst utgöra ett utmärkt alternativ. Ordineras av läkare.

Intravenös injektion

25 mg Nepresol, 1 st torrampull spädes med 10 ml koksalt. Lösningen blir då 2,5 mg/ml. Ge 1 ml (= 2,5 mg) långsamt intravenöst (1 min). Kontrollera BT efter 5 min. Om ej tillräcklig blodtryckssänkning erhållits - upprepa 1 ml. Varje ordination ska ges av läkare, denne bedömer när optimal blodtrycksnivå erhållits samt fortsatt läkemedelsbehandling.

Intravenös infusion

Nepresol i dropp: 25 mg Nepresol i 500 ml koksallösning. Start med 30 ml/timme, kan på läkarordination ökas till max 120 ml/timme.

Vid båda terapierna kontrolleras blodtryck första timmen var 5:e minut, sedan vid behov individuellt, CTG kontinuerligt första timmen, sedan individuellt. Undvik uttalade blodtryckssänkningar - risk för CTG-förändringar.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare