

Rubellavaccination post partum

Faktaägare:

Om rubellascreening under graviditet visar att patienten inte har immunitet bör patienten vaccineras med ett rubellavaccin postpartalt på BB-avdelning. Hos vuxna kvinnor rekommenderas vaccination om immunitetsbedömning visar ingen eller mycket låg antikroppsaktivitet (som gräns anges <10 IU/mL). Om patienten tidigare vaccinerats och ändå har låg antikroppsaktivitet, upprepas vaccineringen bara en gång, en del pat är "low responders" och svarar inte med titerstegring.

Nuvarande vaccin heter M-M-RVAXPRO, Rubivax har utgått. Detta är en kombinationsvaccination av mässling, parotitvirus och rubellavirus. I nuläget finns inget vaccin mot bara rubella. Det är ingen kontraindikation om patienten tidigare vaccinerats för någon av de andra infektionerna.

Dosering: 1 dos intramuskulär i deltooidregionen, administration subcutant görs hos kvinnor med trombocytopeni eller någon koagulationssjukdom.

OBS! se kontraindikationer i FASS.

Plasma eller blodtransfusion givet 3 veckor före eller inom 3 månader efter vaccination kan förhindra vaccinanslag, *vaccination ges då efter 3 månader eller senare.*

Vaccinsvaret påverkas vanligen ej av anti-D-profylax.

Läkemedeldokumentation görs i Cosmic, mallen finns som generella direktiv (GD-lista).

Patienten som inte har en kontraindikation men ändå inte kunnat vaccineras på BB på grund av given blod- eller plasmatransfusion eller annan orsak bör återkomma för vaccinering 3 månader postpartalt. Patienter erbjuds komma till BB för vaccination. Tiden bokas av BM på MVC som håller i efterkontroll. Det tas en grav-test innan vaccination och patienten bör ha ett fungerande

preventivmedel. Tillhör patienten en MVC som är utanför Växjö ska vaccinering även göras på VC. Patienten tar i så fall själv kontakt. Patient som inte kommer till efterkontroll bör själv ta kontakt med BB eller om så önskat med sin VC för vaccinering.

Biverkningar: artrit-artralgi-besvär efter vaccination - liksom efter naturlig rubella - är ej ovanliga hos unga kvinnor.

Amning

Rubellavaccination av rubellamottaglig kvinna postpartum är ej förenad med ökad risk för biverkningar hos mor eller barn. Amning är tillåten. Vaccinivirus kan finnas i bröstmjölken och virus kan enstaka gånger gå över till barnet, men detta har visats vara ofarligt för barnet.

Graviditet

Vaccinivirus kan i låg frekvens föras över till fostret transplacentärt. Vaccinet ska därför inte ges till gravid kvinna. Om kvinna som vaccinerats mot rubella befinns vara gravid är det ej befogat att avbryta graviditeten. En kvinna bör ej påbörja graviditet förrän 1 månad efter vaccination.

Referens:

FASS.se – M-M-RVAXPRO läkemedelsinformation

Infpreg.se – profylax rubella

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare