

Tokolys

Faktaägare:

Vid prematurlt värkarbete och där kontraindikationer inte finns är förstahandsmedlet Bricanyl i form av injektion.

Injektion Bricanyl 0,25 mg ges subcutant. Om detta stoppar värkarna kan det ibland räcka som behandling eller följas av ytterligare enstaka injektioner. Tablett Diklofenak 50 mg x 3 i tre dagar kan vara ett komplement vid graviditetslängd upp till 30 veckor.

Bricanyldropp kan övervägas. Vg se PM Droppbehandlingar

Behandling med Tractocile skall övervägas tidigt i vissa situationer såsom starka värkar och låg gestationsålder, biverkningar av Bricanyl, maternall diabetes, hjärtsjukdom samt vid duplex.

Tractocile – en oxytocinantagonist – är ett läkemedel för behandling av prematurlt värkarbete. Det har samma värkhämmande effekt som Bricanyl men betydligt mindre biverkningar för mamman och påverkar inte blodsockerläget hos diabetiker så som Bricanyl. Det är dock ett dyrare läkemedel.

Tractocile bör användas istället för Bricanyl om lång infusionsbehandling krävs, om pat inte klarar Bricanyl på grund av biverkningar, vid maternell diabetes eller hjärtsjukdom, vid kort gravlängd <29 v och vid flerbörd.

Kontraindikationer är desamma som vid all tokolytisk behandling

- intrauterin infektion
- oklar blödning
- misstanke på fetal hypoxi
- andra tillstånd som kräver omedelbar förlossning

Behandling: Intravenös bolusdos följd av kontinuerlig infusion

Infusionslösningen bereds genom att två 5 ml ampuller à 37,5 mg/5 ml tillförs en 100 ml fys NaCl infusionspåse efter att man tömt ut och kastat 10 ml fys NaCl.

1. Bolusdos 0,9 ml (= 6,75 mg) ges av lösningen 6,75 mg/0,9 ml iv under 1 minut.
2. Högdosinfusion 24 ml/tim (= 18 mg/tim) iv av lösningen under 3 tim.
3. Lågdosinfusion 8 ml/tim (= 6 mg/tim) iv av lösningen till lugnt, upp till 45 tim.

Behandling kan upprepas vid behov, då på samma sätt med inledande bolusdos, både upprepad behandling och förlängd sådan efter särskilt övervägande.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare