

## Venofej järninfusion

Venofej ska bara användas om Ferinject är inte tillgängligt respektive restnoterat.

Patienten ska vara ordinerad Venofej och erhåller skriftlig samt muntlig information ”Till dig som skall få järninfusion”. Patientbroschyr skall finnas tillgänglig på mödravården.

Alla rutiner angående patientbokning motsvarar och hämtas från ”PM för Ferinject- järnbehandling iv.”

### Intravenös infusion

Venofej får endast spädas med steril NaCl-lösning 9 mg/ml. Spädningen ska utföras omedelbart före infusionen.

#### 1:a dosen (testdos)

1 ampull (5 ml) blandas med 100 ml NaCl = 100 mg järn.

De första 25 mg järn ska ges som testdos under 15 minuter. Om inga biverkningar inträffar ska den återstående delen av infusionen ges under 20-25 minuter.

#### 2:a dosen (och därefter följande doser)

2 ampuller (10 ml) blandas med 100 ml NaCl = 200 mg järn.

Infusionen ges under minst 30 minuter.

### För läkarna vid ordination

1. Ny ordination, mall Venofej.
2. Koppla till befintligt inskrivningsbeslut.
3. Skriv recept från färdig ordination.
4. Fyll i 1 förpackning, 5 ampuller.
5. Fyll i 3 veckors duration.
6. Se till att det finns en bock i ”administrera läkemedel i ordinationslistan på enheten”.

## För Bm/SSK

1. Öppna ordinationslistan.
2. Lägg till utdelning.
3. Markera dagen och tiden när läkemedel ges.
4. Högerklicka då finns en dos att administrera.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**