

Gonorre

Faktaägare:

Gonorré är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. För närvarande är den ovanlig i Sverige, men på senare år har en viss ökning skett. I Asien, Afrika, Sydamerika och de forna öststaterna är gonorré betydligt vanligare än i Sverige. I många länder liksom i Sverige, finns numera bakterier som är resistenta mot flera olika antibiotika.

[Se även information via Barnmorskemottagningen/Könssjukdomar](#)

[Smittskyddsheten, smittskyddsblad/Gonorré](#)

Symtom

Uppträder 2 till 14 dagar efter smittotillfället.

Provtagning

Diagnosen fastställs genom prov som tas från urinrör, livmoderhals, ibland även från ändtarm/svalg.

Rutin för smittspårning och behandling

När svar med pos gc-odling kommer efter provtagning på kvinnokliniken omriktas svaret till hudläkare Dr Sandor Szitkay. Hudkliniken informeras också genom telefonkontakt och de kallar patienten tillsammans med fast partner. Partnern provtas och båda behandlas. Hudmottagningen ombesörjer fortsatt smittspårning.

Kvinnliga partners provtas på SESAM-mottagningen ”akut” i samband med besöket på Hudmottagningen. Svar ställs till Hudmottagningen. Provtagaren gör en kort anteckning och diagnosätter besöket.

Behandling

Gonorré botas med antibiotika. Under tiden behandlingen pågår är det förbjudet att ha samlag. På grund av tilltagande problem med bakterieresistens och få fall

Giltig fr.o.m: 2018-02-28

Giltig t.o.m: 2018-03-01

Identifierare: 90136

Gonorre



koncentreras behandling till Hudkliniken.

Enligt Smittskyddslagen är både undersökning och behandling kostnadsfri!

Sjukdomen är anmälningspliktig till smittskyddsläkare.

Om patient misstänks ha salpingit orsakad av gonorré, tas under kontorstid kontakt med Hudmottagningen/Infektionskliniken för råd om antibiotikaval.

Under jourtid använd tills vidare Cefotaxim 1 g x 3 i.v. samt Flagyl 400 mg x 3.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare