

Graviditet med äggdonation

Hos patienter som blivit gravida efter oocytdonation föreligger ökad risk jämfört med andra graviditeter efter IVF/ICSI för graviditetskomplikationer. Graviditet efter äggdonation är en riskgraviditet med en ökad risk:

- blödningar i tidig graviditet,
- graviditetshypertoni och preeklampsi.
- tillväxthämning
- prematurfödsel
- Gestationsdiabetes
- Placenta praevia och ablatio.
- ökad frekvens sectio
- post partumblödningar

Vid riskvärdering och vårdplanering är det viktigt att ta hänsyn till eventuella bakomliggande sjukdomar som orsak till infertiliteten. Många som är gravida via äggdonation är äldre, vilket också medför en ökad risk för komplikationer.

Graviditetsplanering

- Läkargesök i tidig graviditet för graviditetsplanering.
- Indikation för fosterdiagnostik p.g.a. ålder föreligger inte. Anonyma oocytdonatorer är <36 år. Donatorerna har inte rutinmässigt genomgått kromosomanalys, men har genomgått anamnestic screening för ärftliga sjukdomar.
- Sätt in acetylsalicylsyra (T. Trombyl®) 75mg 1x1 från graviditetsvecka 12 och till och med graviditetsvecka 36.
- Blodtryck och U-protein vid varje besök
- Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32, fler vb.
- Barnmorskebesök varje vecka från graviditetsvecka 36.
- Induktion senast graviditetsvecka 40+0. MVC visning alt vid mer komplicerade graviditetsanamnes tid till specialistmödravård v 37+ för förlossningsplanering.