

Vasopressin

Faktaägare:

Användning av licenspreparatet Vasopressin

Vasopressin kan med fördel användas vid operation av myom, extrauterina graviditeter och placenta previa.

Doser och spädningsförfarande

Varje ampull Vasopressin innehåller 5 ml (100 IU). Spädning sker genom att 0,2 ml av Vasopressin (4 IU) blandas med 20 ml koksalt. Detta innebär en dos på 4 IU i en 20 ml spruta med 1 IU per 5 ml.

Detta är generellt rekommenderat att man inte använder mer än 5 IU (25 ml) men då effekten avtar redan inom 1 timme finns det ingen absolut maxdos under ett längre operationsingrepp.

Försiktighet

Hjärtsjukdom.

Samråd med narkospersonal

Innan man injicerar Vasopressin skall narkospersonal och narkosläkare informeras och användandet av preparatet skall ske i samförstånd med dem.

Biverkningar

Risk för hypertoni och ödembildning. Minskad urinproduktion kan också ses om en komplikation.

Applikationsförfarandet

Myomoperation:

5 ml (1 IU) injiceras på vardera fyra ställen kring myombasen, sammanlagt 20 ml. Före injektionen bör aspiration ske så att man förvissar sig om att preparatet inte kommer intravenöst.

Tubargraviditet:

Via en cystpunktionsnål direkt från bukväggen injiceras högst 20 ml (4 IU) Vasopressin i mesosalpinx. För bästa effekt ser man hur ligamentum latum spänner upp sig och vätskeansamlingen förblir i mesosalpinx.

Placenta previa:

5 ml (1 IU) injiceras på vardera fyra ställen i placentabädden, sammanlagt 20 ml. Före injektionen bör aspiration ske så att man förvissas sig om att preparatet inte kommer intravenöst.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare