

## Intravitrealinjektioner, ej Ozurdex

Gäller för: Ögonkliniken

Faktaägare: Karin Hjelmberg  
Karin Ylvén

### Läkemedel

Avastin – flergångsampull 25 mg/ml

Eylea - engångsampull 40 mg/ml

**Ovanstående läkemedel ska inte användas under graviditet!**

Rekommenderad dos är 0,05 ml.

### Material

IVT-set (custom pack)

Handskar

### Arbetsgång

Se arbetsbeskrivning vid IVT-injektion.

#### Vid injektion:

Lägg på ögonduken.

Invitriakoppen appliceras centralt på bulben och roteras. Via sidoöppningen på invitrian injiceras läkemedlet i glaskroppen.

### Avastin-flergångsampull

Okulärbesiktiga lösningen.

Sprita av injektionsflaskans gummimembran med injektionstork.

Sjuksköterska sätter en minispika i injektionsflaskan. Koppla en tvåvägsventil till minispiken.

Ventilen spritas av inför varje ny dos mekaniskt i minst 15 sekunder. Låt sedan lufttorka i 5 sekunder.

OBS! Tänk på att hela kanylen är helt fylld med Avastin så att det inte finns någon luft i systemet.

Kasseras efter ett arbetspass.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**